

شناسایی و بررسی انتوپوتانی منتخبی از گیاهان دارویی شهرستان نیشابور (مطالعه موردی: مرتع زبرخان)

مروارید حسینی^۱, محمد رحیم فروزه^{۲*}, حسین بارانی^۳

۱- کارشناسی ارشد علوم مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

۲- استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

۳- دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

* آدرس مکاتبه: گرگان، میدان بسیج، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مرتع و آبخیزداری

کد پستی: ۴۹۱۸۹۴۳۶۴۶

تلفن و نمابر: (۰۱۷) ۳۲۲۲۰۶۴۰

پست الکترونیک: rfroozeh@gmail.com

[doi: 10.29252/jmp.2.70.212](https://doi.org/10.29252/jmp.2.70.212)

تاریخ تصویب: ۹۷/۱۱/۶

تاریخ دریافت: ۹۷/۸/۳

چکیده

مقدمه: دانش انتوپوتانی بخشی از سرمایه‌ی ملی هر قوم است که باورها و آگاهی‌های محلی آنان از گیاهان و خواص آنها را در بر می‌گیرد که حاصل قرن‌ها آزمون و خطا در محیط طبیعی است و به دلیل شفاهی بودن در معرض انحطاط است.

هدف: تحقیق حاضر با هدف آشنایی و مستندسازی فرهنگ استفاده ستی از گیاهان دارویی مرتع زبرخان از رویشگاه‌های شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی صورت گرفت.

روش بررسی: در این مطالعه دانستنی‌های ستی مردم پیرامون گیاهان در قالب مصاحبه‌ی آزاد و مشاهده‌ی مشارکتی گردآوری شد. مصاحبه‌ها با محوریت نام محلی گیاهان، اندام مورد استفاده، خواص و شوه مصرف گیاهان مطرح و تا جایی ادامه پیدا می‌کرد که پاسخ‌های تکراری ثبات و صحت مصاحبه را محقق می‌ساخت. گیاهان جمع‌آوری شده با استفاده از منابع معتبر گیاه‌شناسی شناسایی شد.

نتایج: در این مطالعه ۷۰ گیاهی دارویی متعلق به ۲۹ خانواده شناسایی شد که در این بین خانواده‌های Lamiaceae، Compositae، Apiaceae، Polygonaceae و Brassicaceae است. نتایج حاصل از بررسی کاربرد ستی گیاهان نشان داد که بیشترین استفاده دارویی از گیاهان جهت درمان بیماری‌های گوارشی، درمان سرماخوردگی، درمان بیماری‌های عصبی، مسکن و آرامبخش می‌باشد. بیشترین کارکرد اندام‌های مصرفی گیاهان شامل سرشاخه‌های گلدار، برگ و ساقه‌های جوان بود. بررسی و مقایسه کاربردهای مختلف گیاهان در منطقه مورد مطالعه و همچنین سایر نقاط ایران تشابه موارد مصرف در میان برخی گونه‌های گیاهی مشابه در مناطق مختلف کشور را به اثبات می‌رساند.

نتیجه‌گیری: وجود ۷۰ گیاه دارویی غنای مرتع مطالعه را نشان می‌دهد. شناخت این گیاهان و مستندسازی دانش پیرامون آنها می‌تواند زمینه مناسبی برای شناسایی اثرات درمانی جدید گیاهان، استفاده بهتر از گیاهان دارویی و فرآورده‌های آنها را فراهم آورد. گل واژگان: انتوپوتانی، دانش بومی، زبرخان، گیاهان دارویی، مشاهده مشارکتی



مقدمه

بومی نسبت به دانش فنی دارای دو مزیت است: بدون هزینه است و به سادگی در دسترس می‌باشد [۹]. علت شکست بسیاری از برنامه‌های توسعه منطبق نبودن آنها با دانش بومی می‌باشد. زیرا مردم سالیان متتمادی با این ارزش‌ها و باورها زندگی کرده و توسعه‌ای که این ارزش‌ها را نادیده بگیرد، چندان مقبولیت و مشروعيت نخواهد یافت و منجر به شکست خواهد بود [۱۰]. بدیهی است که دانش مذکور از حوزه جغرافیایی خاصی سرچشمه گرفته و به طور طبیعی تولید می‌شود و بر اساس کارایی و سازگاری با شرایط محیطی به نواحی مجاور و دور دست انتقال می‌یابد. نظام‌های دانش بومی بشر در زمینه‌های مختلفی مانند زبان‌شناسی، گیاه‌شناسی، جانور‌شناسی، پزشکی، بوم‌شناسی، اقلیم، کشاورزی، دامداری، مهارت‌های حر斐ه‌ای، صنایع دستی و ... که همگی زاییده تلاش برای معیشت پایدار در محیط زیست اوست، جلوه‌گر می‌شود. ثبت و جمع‌آوری این دانش اغلب به عهده مردم نگاران است [۱۱]. اتنوبوتانی یا گیاه مردم نگاری شاخه‌ای از دانش بومی است که به شناخت نقش گیاهان یک منطقه در دانش محلی آنها می‌پردازد [۱۲]. دانش بومی قدمتی به عظمت تاریخ بشر دارد، اما واژه‌ی اتنوبوتانی را اولین بار هارشبیرگر گیاه‌شناس آمریکایی، مطرح کرده است که به مطالعه‌ی گیاهان مورد استفاده توسط مردمان بومی پرداخته است. این دانش از آن زمان به بعد به عنوان بخشی از دانش سنتی تعریف شده است که دانش این جوامع در مورد گیاهان پیرامونشان است و مطالعه‌ای است که تلاش می‌کند دریابد گیاهان چگونه به عنوان غذا، پناهگاه، درمان، لباس، شکار، مراسم مذهبی و ... استفاده می‌شوند [۱۳]. طی دهه گذشته احیای علاقه بیماران، پزشکان، محققین، دانشمندان، صنعتگران و تجار به گیاهان دارویی کاملاً مشهود بوده و همین امر دلیل گسترش مطالعات اتنوبوتانی در سراسر جهان می‌باشد. ردی و همکاران [۱۴]، پنگل و همکاران [۱۵] و ایروم‌ناز و همکاران [۱۶] در این زمینه مطالعات زیادی صورت گرفته بویژه در کشورهای آمریکای جنوبی از جمله برزیل و کشورهای آسیایی مانند هند، پاکستان، تایلند و حتی برخی از کشورهای آفریقایی مانند گینه

در بسیاری از نقاط جهان بویژه نقاط دور افتاده و مکان هایی که به شهرها دسترسی ندارند ابعاد مختلف زندگی جوامع محلی بر پایه‌ی منابع طبیعی، تجربیات و باورهای خود که همگی زاییده‌ی تلاش برای معیشت پایدار است، استوار بوده اند. این باورها، دانسته‌ها و ارزش‌ها زندگی آنان را در برمی گیرد و به بخشی از سرمایه‌ی ملی آن جامعه تبدیل می‌شود [۱-۳]. بهره‌گیری از خرد تجربی انباسته و تاریخی بهره‌برداران محلی، اصطلاحاً دانش بومی نام گرفته است [۴]. این همان دانشی است که در طی قرون با استفاده از آن، اقوام گوناگون روزی خود را از محیط‌شان جسته‌اند. پوشاشان را تهیه کرده اند، خود را در سرپناهی اسکان داده، فرزندان خود را تربیت کرده‌اند، جامعه‌ی خود را سامان داده و سلامت خود و احشام خود را حفظ کرده‌اند [۵]. افراد یک جامعه دانش مذکور را بر اساس تجربه و انطباق با فرهنگ‌های محلی و محیط زیست در طول زمان کسب کرده‌اند که برای حفظ منابع ژنتیکی و ادامه‌ی بقا از آن استفاده می‌شود و فهرستی ذهنی از منابع بیولوژیکی محلی می‌باشد. این دانش بخشی از سرمایه‌ی ملی هر قوم است که باورها، ارزش‌ها، روش‌ها و آگاهی‌های محلی و دانش اکولوژیک آنها از محیط زندگی‌شان را در برمی‌گیرد و حاصل قرن‌ها آزمون و خطا در محیط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی است. این نوع دانش به دلیل شفاهی بودن سخت در معرض انحطاط است [۶]. دانش محلی هر قوم، بومیان را قادر به تأمین نیازمندی‌های خود از منابع طبیعی بدون تحلیل آنها کرده است. بنابراین مجموعه‌ی دانش بومی جهان گزینه‌ی ارزشمندی از روش‌ها و ابزار زمان آزموده‌ای است که در توسعه‌ی پایدار تمام جوامع به کار خواهد آمد. از آنجا که دانش، حاصل تعامل فرد با محیط پیرامونش می‌باشد دانش بومی نیز حاصل تعامل بومیان با محیط پیرامونشان است [۷]. برای این دانش نام‌های دیگری مانند دانش محلی، دانش فنی بومی، دانش سنتی و دانش مردمی وجود دارد. اما اصطلاح دانش بومی بیش از همه به کار گرفته می‌شود. دانش مذکور زمینه‌های مساعدی را برای توسعه فراهم می‌کند [۸]. دانش




منحصر به فرد بودن این دانش در نقاط مختلف جغرافیایی و همچنین عدم وقت کافی برای ثبت این دانش و از بین رفتن آن با مرگ هر کهنسال بومی، پرداختن به آن ضروری و اجتناب ناپذیر است. هدف از این مطالعه شناسایی برخی از گیاهان دارویی مهمی است که به طور گسترده بوسیله ساکنان محلی منطقه زیرخان از مراتع شهرستان نیشابور در درمان بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مواد و روش‌ها

معرفی منطقه

مراتع زیرخان از رویشگاه‌های بخش زیرخان شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی می‌باشد. این منطقه در شمال شرقی ایران و قسمت مرکزی استان خراسان رضوی و شمال شرقی قدمگاه در محدوده طول جغرافیایی ۵۹ درجه و ۳ دقیقه تا ۵۹ درجه و ۱۸ دقیقه طول شرقی و ۳۵ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۱ دقیقه عرض شمالی واقع شده است (شکل شماره ۱). مراتع این منطقه دارای مساحتی حدود ۶۰ هزار هکتار است که در ارتفاع حدود ۱۲۱۳ متر از سطح دریا قرار گرفته شده است [۲۶]. این منطقه شامل ۲۶ روستا و دو شهر تابعه می‌باشد. طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت کل منطقه ۱۴۹۶۵ نفر بوده که از این تعداد ۸۷۲۷ نفر جمعیت شهری و ۵۹۶۸ نفر جمعیت روستایی هستند. دو شهر درود و قدمگاه جزء شهرهای تابعه می‌باشند و همچنین روستاهای داس، کلاته لویدانی، کلاته سلطان، خرم بیگ، مجدآباد، سخدر، سرتلخ، کاریزنو، دولتآباد، حاجیآباد، جعفرآباد، گرینه، حریم آباد، باغشن، قره‌داش، محمدآباد، دانه کاشفیه، چناران، دیزباد بالا، کوشان، حسینآباد (چنگه عباسی)، جوادیه، قلعه وزیر، ده زمان (چشمہ خسرو)، علیآباد، حصار زیرخان، باز حیدر از جمله روستاهای اطراف این مراتع محسوب می‌شوند. اکثریت مردم آن به زبان فارسی تکلم می‌کنند. آب و هوای منطقه براساس طبقه بندي اقلیمی دمازن در ناحیه‌ی آب و هوایی خشک تا نیمه خشک قرار گرفته است، که در نواحی کوهستانی معتدل و در نواحی دشتی به تدریج به میزان دما

در آفریقای مرکزی، لائوس و حتی جزیره دک در اتیوپی در زمرة این مطالعات هستند [۱۷]. کاربرد گیاهان در زندگی جوامع بومی باعث شده است که ایشان اطلاعات زیادی در مورد گونه‌های مختلف گیاهی نظری پراکنش، زیستگاه، فرم رویشی، عمر، دوره گلدهی، زمان برداشت و شیوه برداشت گیاه داشته باشند [۱۸-۲۲]. در ایران نیز محققان مختلف به پژوهش در این مقوله پرداختند به عنوان نمونه دولتخواهی و نبی‌پور [۲۳] با بررسی انتوپوتانی حوزه‌ی آبریز شمال شرقی خلیج فارس به ۷۰ گونه‌ی گیاه دارویی متعلق به ۳۷ خانواده و ۶۲ جنس دست یافتند که بیشترین خانواده‌ها مربوط به کاسنی و جنس کاسنی بود و بیش ترین استفاده در درمان بیماری‌های گوارشی انجام گرفت. خدایاری و همکاران [۱۷] با بررسی انتوپوتانی گیاهان دارویی شهرستان ایذه (استان خوزستان) ۸۴ گونه گیاهی دارویی متعلق به ۳۵ تیره گیاهی شناسایی کردند که تیره‌های Asteraceae با ۱۲ گونه، Apiaceae با ۱۲ و Lamiaceae با ۱۱ گونه، Leguminosae با ۸ گونه گیاهی دارای بیشترین کاربرد بودند. فروزه و همکاران [۱۲] نیز در بین عشاير مراعع دیلگان در استان کهکیلویه و بویر احمد ۷۰ گونه را جمع‌آوری نموده که از ۸ گونه استفاده خوراکی - تقویتی، برای ۷ گونه استفاده خوراکی - دارویی و برای سایر گونه‌ها مصارف دارویی و بهداشتی قائل بودند. طبق بررسی سعادتپور و همکاران [۲۴] در سجاسرود در استان زنجان نتایج به این گونه بود که ۵۲ گونه‌ی دارویی متعلق به ۲۲ خانواده در منطقه شناسایی و بیشترین تعداد را خانواده‌ی نعنایان و کاسنی تشکیل دادند که بیشترین مصرف برای درمان بیماری‌های گوارشی انجام می‌شد. با توجه به نتایج انتوپوتانی در هر منطقه می‌توان به این اصل دست یافت که استفاده از گیاهان در هر منطقه آداب متفاوتی دارد، به عنوان مثال ممکن است یک گیاه در یک منطقه به عنوان دمنوش و در منطقه‌ی دیگر به صورت ضماد مورد استفاده قرار گیرد همچنین ممکن است در دو منطقه متفاوت براي درمان دو بیماری متفاوت مصرف شود [۲۵]. استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر بشر است و با مکتوب کردن دانش بومی گیاهان دارویی کشور می‌توان به مرجعیت علمی و انحصاری ایران و میراث مکتوب غنی پزشکی آن دست یافت. لذا با توجه به متمایز و




شکل شماره ۱- موقعیت مراتع زیرخان در شهرستان نیشابور [۴۵]

آن رواج دارد، نواحی مرکزی یا کوهپایه‌ای با بافت خاک سیلتی-لومی که جوامع محلی علاوه بر دامداری به زراعت غله و علوفه نیز اشتغال دارند و نواحی جنوبی یا دشتی با بافت خاک سنگین که عمدتاً باغات پسته در آن رو به گسترش می‌باشد. این تنوع عوامل محیطی (عمدتاً توپوگرافیکی و ادفیکی) موجب تغییر و تنوع در پوشش گیاهی و انواع بهره‌برداری شده است؛ به طوری که انواع فرم‌های رویشی گیاهی با خواص مختلف خوارکی و دارویی را می‌توان در منطقه ملاحظه نمود همچنین آثار و بقایای موجود از قبیل رباط‌ها، سنگ نوشه‌های کهن و درختان چنار دیرزیست منطقه همه نشان از قدامت کهن و تاریخی و سابقه بهره‌برداری طولانی و بالطبع داشت بومی غنی این مناطق بیلاقی و کوهستانی را نمایان می‌سازد. حدود ۷۰ درصد از بهره‌برداران را طوایف نیمه کوچنشین سادات حسینی تشکیل می‌دهند که اغلب کهنسالان، چوپانان، طبیبان محلی و خبرگان آن به لحاظ برخورداری از داشت بومی مرتبط با طبیعت نظیر دامداری، زنبورداری، زراعت و شناسایی و بهره‌برداری از گیاهان دارویی در میان طوایف دیگر شهره هستند. اما متأسفانه علیرغم تمام اثرات سودمندی که مطالعات اتنوبوتانی می‌تواند داشته باشد و مجتمع علمی نیز به خوبی در جریان ارزش حفظ داشت بومی و از جمله داشت بومی مرتبط با محیط طبیعی و گیاهان هستند، به ندرت این تحقیقات در منطقه مطالعه مورد

افزوده و از بارندگی کاسته می‌شود. ماههای خشک سال عمدهاً از ابتدای فصل تابستان شروع و تا اواخر پاییز ادامه می‌باید (شکل شماره ۲). متوسط دما حدود $14/25$ درجه‌ی سانتی‌گراد می‌باشد. دی ماه با متوسط $2/1$ درجه‌ی سانتی‌گراد سردترین ماه و تیر با متوسط حدود $25/8$ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ماه سال می‌باشد و حداقل و حداکثر مطلق درجه حرارت $-6/75$ و $23/8$ درجه‌ی سانتی‌گراد گزارش شده است. متوسط میزان بارندگی سالانه منطقه حدود $230/9$ میلی‌متر است. حداقل بارش در منطقه کوهستانی $322/5$ میلی‌متر و حداقل بارش در مناطق دشتی $148/3$ میلی‌متر می‌باشد. بیشترین بارندگی ماهانه حدود $47/2$ میلی‌متر مربوط به اسفند ماه و کمترین بارش مربوط به مرداد ماه $0/3$ میلی‌متر است [۲۷].

مراتع مورد مطالعه در زمرة جوامع گیاهی مناطق نیمه خشک ناحیه ایران و تورانی به شمار می‌رود. این ناحیه بیشتر به صورت بوته و چمنزار است که در گذشته جنگل بوده و در حال حاضر در بعضی نقاط آن خاک کاملاً فرسوده شده و استعداد تبدیل به جنگل خصوصاً جنگل‌های خشک را دارا می‌باشد. گونه‌های غالب این منطقه شامل: درمنه، مرغ، پونه اسبی، جو میش، گیاهان بالشتکی و ماش و درختچه‌ها می‌باشد. این منطقه به لحاظ عوامل محیطی (عمدتاً خاک و ارتفاع از سطح دریا) به سه ناحیه تقسیم می‌شود: نواحی شمالی یا کوهستانی که دارای بافت خاک نسبتاً سبک می‌باشد و عمدتاً باغداری در



شکل شماره ۲- منحنی آمپر و ترمیک منطقه مورد مطالعه

سایر منابع گیاهان دارویی [۳۹-۴۳] شناسایی شدند. عملیات پیمایش صحرایی با توجه به آب و هوا، اقلیم منطقه، فصل و محل رویش گیاهان صورت گرفت؛ در این مطالعه باورها و دانستنی‌های سنتی مردم پیرامون گیاهان در قالب مصاحبه آزاد و مشاهده مشارکتی گردآوری شد. لازم به توضیح است که در مشاهده مشارکتی محقق به همراه افراد بومی در محل رویشگاه گیاهان و یا هنگام فرآوری و بهره‌برداری از آن حضور یافته و این امر سبب می‌شود که درک بهتری از گیاه و شیوه‌های مصرف آن داشته باشد. این شیوه برای کار اکتشافی در این زمینه بسیار مناسب است، چراکه هم کار پرسیدن پیرامون گیاهان را برای مصاحبه کننده و هم کار یادآوری و تداعی را برای مصاحبه شونده آسان می‌سازد و از برداشت‌های غلط مصاحبه‌گر و اطلاع دهنده پیشگیری به عمل می‌آید و به تدریج مصاحبه‌گر را در شناخت خود از گیاهان دقیق‌تر می‌سازد [۴۴]. مصاحبه‌ها به صورت هدفمند از خبرگان محلی ساکنان روستاهای صورت گرفت و لذا در مدت اقامت در منطقه از اغلب افراد آگاه در گروه‌های متفاوت سنی کسب اطلاعات شد. این افراد شامل سالخوردهای، زنان خانه‌دار، طبیبان محلی، جوانان، تحصیلکردهای عشاپر، عطارها و چوپانان مجرب بودند [۱۱]. مصاحبه‌ها با محوریت نام محلی گیاهان، فرم رویشی، زمان جمع‌آوری، نحوه برداشت، اندام مورد استفاده و نحوه مصرف، مقدار مصرف، شیوه آماده‌سازی، زمان و نحوه جمع‌آوری و خواص گیاهان مطرح و اطلاعات مورد نظر گردآوری شد. لازم به ذکر است پرسش و مصاحبه تا جایی ادامه پیدا می‌کرد که پاسخ‌های تکراری ثبات و صحت مصاحبه را محقق می‌ساخت.


صورت گرفته است. گرچه شاید این تحقیقات بسیار ضروری‌تر از تحقیقات آزمایشگاهی و یا عرصه‌ای باشند چرا که زمان برای انجام آزمایشات علمی همیشه هست اما دانشی که مختص پیران دوره‌ای خاص در جامعه‌ای خاص است، همیشه فرصت ثبت آن وجود ندارد. به علاوه بررسی منابع گویای آن است که تحقیقات دانش بومی پیرامون محیط طبیعی و گیاه‌شناسی در هر جای دنیا دارای یافته‌هایی هستند که در سایر تحقیقات مشابه در جاهای دیگر نیامده است و این از شاخص‌ترین ضروریات انجام این گونه پژوهش‌هاست [۲۸].

روش بررسی

از آنجا که گام ابتدایی در مطالعات اتنوبوتانی شناخت صحیح محدوده منطقه مورد بررسی است و در این راستا شناخت تمامی عوارض طبیعی، راه‌ها و جاده‌ها الزامی می‌باشد؛ لذا پس از بررسی نقشه‌های توپوگرافی و لایه‌های به دست آمده از آن همچون نقشه‌شیب و جهت و تعیین اولیه محدوده منطقه از طریق عکس‌های ماهواره‌ای، با حضور در ناحیه مورد مطالعه، پیمایش صحرایی و استفاده از اطلاعات افراد بومی، مسیرهای تردد، عوارض طبیعی و روستاهای منطقه مورد شناسایی قرار گرفته و طرح مناسبی جهت بررسی‌های میدانی، مصاحبه‌ها و جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی تهیه شد. این نمونه برداری طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ طی فصول مختلف رویش گیاهان صورت پذیرفت. گیاهان جمع‌آوری شده پس از آماده سازی به هریاریوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتقل شده و با استفاده از منابع معتبر گیاه‌شناسی ایران [۳۷، ۳۸] و برخی مناطق همجوار و همسایه ایران [۳۹-۴۱] و

شوندگان از ۷۶ تا ۲۶ سال بود. گروه‌های سنی افراد مصاحبه شونده در شکل شماره ۳ ارائه شده است؛ همچنین سطح تحصیلات و جزئیات مربوط به جمع‌آوری اطلاعات جوامع محلی به ترتیب در جدول شماره‌های ۱ و ۲ آورده شده است.

در مجموع از ۷۰ نفر مصاحبه شد که از این تعداد ۴۰ نفر مرد و ۳۰ نفر زن بودند. در مجموع ۴۲ مصاحبه فردی و ۵ مصاحبه جمعی در گروه‌های ۵ تا ۷ نفره انجام شد که اکثر مصاحبه شوندگان مسن و بی‌سواد بودند. سن مصاحبه



شکل شماره ۳- گروه‌های سنی افراد مصاحبه شونده

جدول شماره ۱- مشخصات افراد پرسش شونده در منطقه مورد مطالعه

مرد	زن	سطح تحصیلات	بی‌سواد	سیکل و پایین‌تر	دیپلم	فوق دیپلم و بالاتر
۱۵	۱۰	۱۳	۲	۱		
۳	۷	۱۷	۳			

جدول شماره ۲- جزئیات مربوط به جمع‌آوری اطلاعات از افراد محلی در منطقه مورد مطالعه

ردیف	منطقه	افراد پرسش شده در مطالعه	مرد	زن
۱	روستای داس	-	۱	-
۲	روستای قره بیک	۲	۱	-
۳	روستای پست فروشان	۱	-	-
۴	روستای کلاته لویدانی	۲	-	-
۵	روستای کلاته سلطان	-	۳	-
۶	روستای خرم بیگ	۲	-	-
۷	روستای مجدا آباد	-	۳	-
۸	روستای سخدر	۲	-	-
۹	روستای سرتلخ	۳	-	-
۱۰	روستای کاریزنو	۱	-	-
۱۱	روستای دولت آباد	۱	-	-
۱۲	روستای حاجی آباد	-	۳	-
۱۳	روستای جعفر آباد	۲	-	-
۱۴	روستای گریته	۱	-	-
۱۵	روستای حريم آباد	۱	-	-
۱۶	روستای باغشن	۲	-	-
۱۷	روستای قره داش	۱	-	-
۱۸	روستای محمد آباد	-	۲	-

ادامه جدول شماره -۲

افراد پرسش شده در مطالعه			منطقه	ردیف
مرد	زن			
۱	-		روستای دانه کاشفیه	۱۹
۱	۱		روستای چناران	۲۰
۱	۲		روستای دیزباد بالا	۲۱
۲	-		روستای کوشان	۲۲
۱	-		روستای حسین آباد (چنگه عباسی)	۲۳
-	۳		روستای جوادیه	۲۴
۲	۱		روستای قلعه وزیر	۲۵
-	۱		روستایی ده زمان (چشم خسرو)	۲۶
-	۱		روستای علی آباد	۲۷
۱	-		روستای حصار زیرخان	۲۸
۱	-		روستای باز حیدر	۲۹
۴۰	۳۰		مجموع	

از گیاهان کاربردهای چندگانه‌ای در طب سنتی افراد محلی دارند *Heracleum persicum* و *Alcea officinalis* و *Achillea millefolium* که از آن میان می‌توان به اشاره این مطالعات گیاهان دارویی مناسب می‌باشد. برای تسهیل در ارائه اندام‌های هوایی گونه‌های جمع‌آوری شده شامل برگ، سرشاخه‌های تازه، ساقه و بذر گیاهان بیشترین استفاده را در بین جوامع محلی منطقه دارا بود (شکل شماره ۵).

فراوانی ثبت (FC) و فراوانی ثبت نسبی (RFC) گیاهان دارویی منطقه تعداد افراد آگاه بومی که کاربرد گونه‌ی گیاهی را بیان کرده باشند فراوانی ثبت نامیده می‌شوند. شاخص کمی فراوانی ثبت نسبی با تقسیم فراوانی ثبت نسبی بر تعداد افراد آگاه بومی در مطالعه به دست می‌آید. این شاخص از صفر (در زمانی که هیچ فرد آگاه بومی کاربردی را برای گیاه مورد نظر عنوان نکرده باشد) تا یک (که تمام افراد آگاه بومی کاربرد دارویی برای گیاه مورد نظر بیان کرده باشند) متغیر است. طبق بررسی‌های صورت گرفته گیاهانی از قبیل کنگر (*Gundelia tournefortii*), ریواس (*Allium peloprasum*), ترهکوهی (*Rheum khorasanicum*), چای کوهی (*Stachys levendofolia*) و پونه کوهی (*Mentha longifolia*) دارای بالاترین فراوانی ثبت و ثبت نسبی در بین گیاهان دارویی منطقه می‌باشند (شکل شماره‌های ۶ و ۷).

نتایج

مرا תע زیرخان به علت تنوع در پوشش گیاهی، برای انجام مطالعات گیاهان دارویی مناسب می‌باشد. برای تسهیل در ارائه مطالب، اطلاعات جمع‌آوری شده پیرامون گیاهان دارویی این مرتع به همراه ویژگی‌های هر گیاه شامل نام محلی، نام فارسی، نام علمی، اندام مورد استفاده و مصارف سنتی آن توسط بهره برداران در جدول شماره ۳ آورده شده است. جدول مذکور گویای آن است که مراتع مورد بررسی ۷۰ گونه دارویی دارد که متعلق به ۲۹ خانواده است. بیشترین سهم در ترکیب گونه‌ها به ترتیب مربوط به خانواده‌های Lamiaceae با ۱۴ گونه، Apiaceae با تعداد ۸ گونه، Compositae با ۷ گونه و Brassicaceae با تعداد ۶ گونه است (شکل شماره ۴). خانواده‌های مذکور در بین خانواده‌های گیاهی از غنای زیادی برخوردار بوده و از نظر ویژگی‌های دارویی گیاهان نیز از خانواده‌های پر اهمیت گیاهان گلدار به شمار می‌آیند. از میان مصارف سنتی و محلی بیشترین کاربرد مربوط به درمان بیماری‌های گوارشی، سرماخوردگی و بیماری‌های عصبی بود (جدول شماره‌های ۳ و ۴). هرچند که غالب گونه‌ها مصارف دارویی داشتند، اما تعدادی نیز نظیر *Allium ampeloprasum* و *Allium xiphopetalum* و *Allium oschaninii* صورت خوراکی- دارویی به مصرف می‌رسند؛ همچنین برخی



جدول شماره ۳- انتوپوتانی چیاهان دارویی مبنیه مواد مطالعه

شماره هربایدوم	نحوه استفاده	محوّص دارویی	نام معطر	نام قاروس	نام علی	خواص
۱۱۰	خام به صورت سبزی و پخته در آمیخته غذا (خوارکی)	دغ کرمه‌هدی معده و درمان بیوست	برگ و پیاز	ثیتر	<i>Allium ampeloprasum</i> L.	Amaryllidaceae
۱۱۱	خام به صورت سبزی و پخته در آمیخته غذا (خوارکی)	کمک به هضم غذا و دفع آن، خنده‌زده و مفید برای دردهای ناشی از روماتیسم	برگ و پیاز	بیزکوهی	<i>Allium oschaninii</i> O.Fedtsch	
۱۱۲	خام و پخته همراه با گیاه گندم (خوارکی)	دارای مفعّل گیرم، تکین در درمان مصالح دارمازی	اجار	لواری	<i>Allium xiphopetalum</i> Aitch. & Baker	
۱۱۳	بیض همراه با بیانات (خوارکی)	دو مان بیوست	برگ و سرشاره	سلمه	<i>Chenopodium album</i> L.	Amaranthaceae
۱۱۴	خام به صورت بودزد شده (خوارکی)	فاسیلان، طعم‌دهنده، هضم بستر غذا	های تازه	سماق	<i>Rhus coriaria</i> L.	Anacardiaceae
۱۱۵	خام به صورت سبزی و پخته همراه غذا و نیبات (خوارکی)	دارای ضعی گیرم، کمک به هضم غذا و فلنج درمان سروره، افزایش شیر مادر، تنفس و کاهش درد ناشی از قاعده‌گردی کمک به هضم غذا و بهبود کارکرد زوده با جو گیری از بیوست	برگ و سرشاره	زارانه	<i>Anethum graveolens</i> L.	Apiaceae
۱۱۶	خام به صورت سبزی و پخته همراه غذا و نیبات (خوارکی)	کاهش اسباب معده، درمان زخم معده، غذا و نیبات	برگ و سرشاره	گردو	<i>Bunium afghanicum</i> Beauverd	
۱۱۷	خام به صورت سبزی و پخته همراه غذا و نیبات (خوارکی)	رفع سردی مراج	های تازه	مشوی	<i>Bunium chaerophyllumoides</i> (Regel & Schmalh.) Drude	
۱۱۸	خام و پخته همراه با برج و معطی کننده	دارای ضعی گیرم، فلنج و رفع دل درد، کاهش درد ناشی از قاعده‌گردی	پدر	زبرد	<i>Bunium persicum</i> (Boiss.) B.Fedtsch	
۱۱۹	خام و معرف با این رای نیبات (خوارکی)	صد غنیمت و ضدقارچ، انتہائی آور و افزایش قوای بدن	برگ تازه	خارمسک	<i>Echinophora platylopha</i> DC.	
۱۲۰	لائز، قوای بدن، افزایش اندام	ور	برگ تازه	بلوری	<i>Eryngium carline</i> F.P.Delaroche.	
۱۲۱	خام به عموان صمعه و درمان سروره آن (خوارکی)	کاهنده اسید معده و درمان سروره آن	برگها و ساقه‌های	کسبیل	<i>Hieracium persicum</i> Desf. ex Fisch	
۱۲۲	جوان، پدر	فلنج غذه‌غونی کننده مطبخ	برگ و پدر	چون	<i>Prangos latiloba</i> Korovin	جالشیر مج دوست
۱۲۳	جوشانده، عرق و طعم‌دهنده نوشیرات (خوارکی)	کمک به هضم غذا و ضد فلنج، کاهش درد ناشی از قاعده‌گردی				



آدما جدول شماره ۳۲

شماره هرلاربوص	نحوه استفاده	خاصیت دارویی	ادامه مورد استفاده	نام محلی	نام فارسی	نام علمی	خواص دارویی	آدما جدول شماره ۳۲
۱۱۵۴	پخته همراه با ماست (خوارک)	پخته همراه با ماست (خوارک) و استعمال خارجی	آدمه لایه و ضد عموی کته زخم	برگ های نازه	زکورهای لوب دراز	<i>Oenotoma longiloba</i> Bunge	Boraginaceae	
۱۱۵۵	خام به صورت شربت	خام به صورت شربت	لب در رفع عطش و کرم ازگی درمان اسهال	پدر	زکورهای لوب دراز	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	Brassicaceae	
۱۱۵۶	خام و پخته مخلوط با نیبات	خام و پخته مخلوط با نیبات	زکورهای لوب دراز و خانه اوز	برگ و سرشاره های نازه	زکورهای لوب دراز	<i>Lepidium draba</i> L.		
۱۱۵۷	خام و پخته	خام و پخته	دومن بیوست و هضم کته غذا	برگ و سرشاره های نازه	دومن بیوست و هضم کته غذا	<i>Corringia orientalis</i> (L.) Dumort.		
۱۱۵۸	بخته مخلوط با ماست	خام و پخته	دومن جوش صورت	برگ و سرشاره های نازه	دومن جوش صورت	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.		
۱۱۵۹	خام و پخته	خام و پخته	میوه نیزه و نکتکی دهدنه الیات بوسنی	علف گرمه های نازه	میوه نیزه و نکتکی دهدنه الیات بوسنی	<i>Erysimum repandum</i> L.		
۱۱۶۰	خام و پخته	خام و پخته	کتک به هضم غذا مکن قزو و درد	برگ و سرشاره های نازه	کتک به هضم غذا مکن قزو و درد	<i>Sisymbrium loeselii</i> L.		
۱۱۶۱	جوانشله و کوبیده شده و به صورت ضماد	جوانشله و کوبیده شده و به صورت ضماد	دومن درد مظاصل ازین بودن که های رو ره	میوه و بذر	دومن درد مظاصل ازین بودن که های رو ره	<i>Capparis spinosa</i> L.	Capparaceae	
۱۱۶۲	جوانشله و کوبیده شده و به صورت ضماد	جوانشله و کوبیده شده و به صورت ضماد	دومن خلط آور و زرگندی سبه	علف چشک	علف چشک	<i>Agrostemma githago</i> L.	Caryophyllaceae	
۱۱۶۳	جوانشله و عرق	جوانشله و عرق	آدمه مارس	جوانشله و عرق	جوانشله و عرق	<i>Achillea millefolium</i> L.	Compositae	
۱۱۶۴	جوانشله و دمنش	جوانشله و دمنش	سبز بر رفع دلیجه و حالت نهود	برگ و سرشاره های نازه	سبز بر رفع دلیجه و حالت نهود	<i>Achillea santolinoides</i> subsp. <i>Wilhelmsii</i> (K. Koch) Greater		
۱۱۶۵	جوانشله و دمنش	جوانشله و دمنش	فساسهای درمان ایگل های روده و الشیم	آدمه مارس	آدمه مارس	<i>Artemisia porsica</i> Boiss.		
۱۱۶۶	جوانشله و دمنش	جوانشله و دمنش	سوزش محل نیش حشرات کاملش در	برگ و سرشاره های نازه	سوزش محل نیش حشرات کاملش در	<i>Agave attenuata</i> Schult.	Agavaceae	
۱۱۶۷	جوانشله و دمنش	جوانشله و دمنش	قاعدگی	برگ و سرشاره های نازه	قاعدگی	<i>Agave lechuguilla</i> Engelm.	Agavaceae	
۱۱۶۸	جوانشله و دمنش	جوانشله و دمنش	میوه دار آیینه دارن سرد و چن	برگ و سرشاره های نازه	میوه دار آیینه دارن سرد و چن	<i>Agave deserti</i> Engelm.	Agavaceae	
۱۱۶۹	جوانشله و دمنش	جوانشله و دمنش	عصری و کاهده شمار خون	برگ و سرشاره های نازه	عصری و کاهده شمار خون	<i>Agave deserti</i> Engelm.	Agavaceae	
۱۱۷۰	جوانشله و دمنش	جوانشله و دمنش	درمان سرماخوردگی نیزه و کشک به هضم	برگ و سرشاره های نازه	درمان سرماخوردگی نیزه و کشک به هضم	<i>Agave deserti</i> Engelm.	Agavaceae	
۱۱۷۱	جوانشله و عرق	جوانشله و عرق	دارای طبع سرد مدیر کاهده بتری و نصبه	برگ و ساره	دارای طبع سرد مدیر کاهده بتری و نصبه	<i>Cichorium intybus</i> L.		
۱۱۷۲	کندن خون درمان برقان و جوش صورت	کندن خون درمان برقان و جوش صورت	کندن خون درمان برقان و جوش صورت	کاسنی	کاسنی	<i>Crataegus laevigata</i> L.		
۱۱۷۳	افروند مendar شیر مادران کاهده بتری خون	افروند مدار شیر مادران کاهده بتری خون	افروند مدار شیر مادران کاهده بتری خون	کنک	کنک	<i>Grandtia tournefortii</i> L.		
۱۱۷۴	تفویت غیر از جنس	تفویت غیر از جنس	خام و پخته به صورت بوزاری و خوارزشت					



ادامه جدول شماره ۲-

شماره هریاربوونی	نحوه استفاده	خواص دارویی	نام مفعلي	نام فارسی	نام علمی	خواص دارویی
۱۶۸۱	جوانلده (خوارکی)	از امراض، درمان سردو و می خواری. نفثه، کته، زمان قاعده و نسکره	گل، برگ	بامونه	<i>Tripleurospermum disciforme</i> (C.A.Mey.) Sch.Bip	Compositae
۱۶۷۴	پخته (خوارکی)	دوده، تندیز ناشی از آن درمان دل درد و دریچه	برگ و سرتاخه ها بوسوس و اسهال خرسن	بیچک، پیچک صریچک	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Ephedraceae
۱۶۷۱	عرق (خوارکی)	مشین و مول عینه از درمان	برگ و ساقه	بیچک	<i>Ephedra major</i> Host	Ephedraceae
۱۶۷۰	ضماد و رون (خوارکی) و استعمال خارجی	سرماخوردگی و کلرود	برگ و ساقه	کوهن	<i>Ricinus communis</i> L.	Euphorbiaceae
۱۶۶۹	خشم بخته و دموض (خوارکی)	خشم بخته و دموض (خوارکی)	برگ و ساقه	کن از زن ریبا	<i>Lycianthes elegans</i> Bunge	Lamiaceae
۱۶۶۶	جوانلده و عرق (خوارکی)	صدای هال، صفرابه، کاهنده چربی حوز	ترک و سرتاخه ها سانه	کپوره	<i>Marrubium vulgare</i> L.	
۱۶۶۷	جوانلده، خام و پخته، طعم دهنده	کشک به هضم، بهتر غذا، تقویت معده	کرک، ساقه	کوهن	<i>Mentha longifolia</i> (L.) L.	
۱۶۶۵	درمان فرش کرون و کاهنده ایهاده رفع نفخ و دلود، مسکن برای درد	جوانلده، خشم و ضعف دهنده لبیات	برگ و ساقه	بزنه	<i>Nepeta cataria</i> L.	
۱۶۶۴	استخوان، درمان سرفه و خرد اسهال	رفع نفخ و دلود، مسکن برای درد	برگ و ساقه	بزنه سای کیریانی	<i>Nepeta saturnoides</i> Boiss.	
۱۶۶۳	جوانلده، خاب، طعم دهنده لبیات	هرضم غذا و رفع درمان دل درد	هرضم غذا و رفع درمان دل درد	بزنه	<i>Mentha pulegium</i> L.	
۱۶۶۱	(خوارکی)	طعم دهنده برای غذا	ترک و سرتاخه	کل زدرا	<i>Nepeta bracteata</i> Benth.	
۱۶۶۰	جوانلده، دموض و عرق (خوارکی)	درمان سرماخوردگی و سرف	های تازه	استطریخه	بزنه سای مرزدی	
۱۶۵۹	آزمیش و مسک سردو	ترک و سرتاخه ها	ترک و سرتاخه ها	س	<i>Nepeta peregrina</i> Boiss.	
۱۶۵۸	دزدکده و صورت چایی، جوانلده	ترک دوده و مصالح و داروه، ضد نفخ	ترک و سرتاخه ها	فاصی	<i>Zelaphora leonuri</i> L.	
۱۶۵۷	خندقوق، درمان دل درد	مسکن سردو، کاهنده و شماره	ترک و ساقه	بزنه	<i>Salvia chloroleuca</i> Rech.f. & Aellen	
۱۶۵۶	(خوارکی)	الیموده و خندقوقی کشنه زخم	ترک	مریمه گلی سید	<i>Stachys lavandulifolia</i> Vahl	
۱۶۵۵	حام، جوانلده، دموض و هضم دهنده	آزمیش، درمان سرماخوردگی، خلد	ترک	مریمه گلی فرجی		
۱۶۵۴	(خوارکی)	آدمه مواس	آدمه مواس	چای کرمه		
۱۶۵۳	دو درمان کلی و حسکی بند					




ادامه جدول شماره ۳-

شماره هریاپوچ	نحوه استفاده	خواص دارویی	نام محلی	نام قاروس	نام خارجی	نام علمی	گناوه
۱۱۲۵	ضم و خشند و دموضی	ضد سرف، خنطه، خدابسته، آرام‌دهن، مسکن درد و ضمیره، درمان سرماخوردگی و آرام‌دهن، مسکن درد و ضمیره	برگ و ساقه	اوشن	مشک خردکن، کاکونی تکمه	<i>Ziziphora clinopodioides</i> L.am.	Lamiaceae
۱۱۲۶	(خوارکی)	خام، دموضی و ضمیره	برگ و سرشاره	کاکونی	کاکونی بیانی	<i>Ziziphora taurica</i> M.Bieb.	
۱۱۲۷	خام، دموضی و ضمیره	ضد سرف، خنطه، درمان گمرکه‌گرد و سرماخوردگی، آرام‌دهن	های نازه	های نازه	برازعل	<i>Perovskia abrotanoides</i> Kar.	
۱۱۲۸	خام، جوشانکه و عرق	مسکن درد عدی رو بانسی، دفع کرم و لکلک	های نازه	های نازه	ارونبه	<i>Medicago sativa</i> L.	Leguminosac
۱۱۲۹	(خوارکی)	خوارکه و خشند	های نازه	های نازه	بوبجه		
۱۱۳۰	خوارکه و خشند	طریز و شاذی پرست	موکن	موکن	مالک	<i>Vicia sepium</i> L.	Malvaceae
۱۱۳۱	خوارکه و خشند	طفکات نفس رفه الهاب	برگ کل	خسی سبد	خس	<i>Athaea officinalis</i> L.	
۱۱۳۲		دهن و حلق، ضد سرف و گلودر					
۱۱۳۳		درمان سرماخوردگی، تقویت و زخم					
۱۱۳۴		کشته مو درمان بیوت					
۱۱۳۵		سرماخوردگی، تقویت مو درمان					
۱۱۳۶		سرماخوردگی، تقویت مو درمان					
۱۱۳۷		پیوت					
۱۱۳۸		خوارکه و استعمال خارجی					
۱۱۳۹		خوارکه و استعمال خارجی					
۱۱۴۰		آشیانه و خشم					
۱۱۴۱		آشیانه و خشم					
۱۱۴۲		آشیانه و خشم					
۱۱۴۳		آشیانه و خشم					
۱۱۴۴		آشیانه و خشم					
۱۱۴۵		آشیانه و خشم					
۱۱۴۶		آشیانه و خشم					
۱۱۴۷		آشیانه و خشم					
۱۱۴۸		آشیانه و خشم					
۱۱۴۹		آشیانه و خشم					
۱۱۵۰		آشیانه و خشم					
۱۱۵۱		آشیانه و خشم					
۱۱۵۲		آشیانه و خشم					
۱۱۵۳		آشیانه و خشم					
۱۱۵۴		آشیانه و خشم					
۱۱۵۵		آشیانه و خشم					
۱۱۵۶		آشیانه و خشم					
۱۱۵۷		آشیانه و خشم					
۱۱۵۸		آشیانه و خشم					
۱۱۵۹		آشیانه و خشم					
۱۱۶۰		آشیانه و خشم					
۱۱۶۱		آشیانه و خشم					
۱۱۶۲		آشیانه و خشم					
۱۱۶۳		آشیانه و خشم					
۱۱۶۴		آشیانه و خشم					
۱۱۶۵		آشیانه و خشم					
۱۱۶۶		آشیانه و خشم					
۱۱۶۷		آشیانه و خشم					
۱۱۶۸		آشیانه و خشم					
۱۱۶۹		آشیانه و خشم					
۱۱۷۰		آشیانه و خشم					
۱۱۷۱		آشیانه و خشم					
۱۱۷۲		آشیانه و خشم					
۱۱۷۳		آشیانه و خشم					
۱۱۷۴		آشیانه و خشم					
۱۱۷۵		آشیانه و خشم					
۱۱۷۶		آشیانه و خشم					
۱۱۷۷		آشیانه و خشم					
۱۱۷۸		آشیانه و خشم					
۱۱۷۹		آشیانه و خشم					
۱۱۸۰		آشیانه و خشم					
۱۱۸۱		آشیانه و خشم					
۱۱۸۲		آشیانه و خشم					
۱۱۸۳		آشیانه و خشم					
۱۱۸۴		آشیانه و خشم					
۱۱۸۵		آشیانه و خشم					
۱۱۸۶		آشیانه و خشم					
۱۱۸۷		آشیانه و خشم					
۱۱۸۸		آشیانه و خشم					
۱۱۸۹		آشیانه و خشم					
۱۱۹۰		آشیانه و خشم					
۱۱۹۱		آشیانه و خشم					
۱۱۹۲		آشیانه و خشم					
۱۱۹۳		آشیانه و خشم					
۱۱۹۴		آشیانه و خشم					
۱۱۹۵		آشیانه و خشم					
۱۱۹۶		آشیانه و خشم					
۱۱۹۷		آشیانه و خشم					
۱۱۹۸		آشیانه و خشم					
۱۱۹۹		آشیانه و خشم					
۱۱۱۰		آشیانه و خشم					
۱۱۱۱		آشیانه و خشم					
۱۱۱۲		آشیانه و خشم					
۱۱۱۳		آشیانه و خشم					
۱۱۱۴		آشیانه و خشم					
۱۱۱۵		آشیانه و خشم					
۱۱۱۶		آشیانه و خشم					
۱۱۱۷		آشیانه و خشم					
۱۱۱۸		آشیانه و خشم					
۱۱۱۹		آشیانه و خشم					
۱۱۲۰		آشیانه و خشم					
۱۱۲۱		آشیانه و خشم					
۱۱۲۲		آشیانه و خشم					
۱۱۲۳		آشیانه و خشم					
۱۱۲۴		آشیانه و خشم					
۱۱۲۵		آشیانه و خشم					
۱۱۲۶		آشیانه و خشم					
۱۱۲۷		آشیانه و خشم					
۱۱۲۸		آشیانه و خشم					
۱۱۲۹		آشیانه و خشم					
۱۱۳۰		آشیانه و خشم					
۱۱۳۱		آشیانه و خشم					
۱۱۳۲		آشیانه و خشم					
۱۱۳۳		آشیانه و خشم					
۱۱۳۴		آشیانه و خشم					
۱۱۳۵		آشیانه و خشم					
۱۱۳۶		آشیانه و خشم					
۱۱۳۷		آشیانه و خشم					
۱۱۳۸		آشیانه و خشم					
۱۱۳۹		آشیانه و خشم					
۱۱۴۰		آشیانه و خشم					
۱۱۴۱		آشیانه و خشم					
۱۱۴۲		آشیانه و خشم					
۱۱۴۳		آشیانه و خشم					
۱۱۴۴		آشیانه و خشم					
۱۱۴۵		آشیانه و خشم					
۱۱۴۶		آشیانه و خشم					
۱۱۴۷		آشیانه و خشم					
۱۱۴۸		آشیانه و خشم					
۱۱۴۹		آشیانه و خشم					
۱۱۵۰		آشیانه و خشم					
۱۱۵۱		آشیانه و خشم					
۱۱۵۲		آشیانه و خشم					
۱۱۵۳		آشیانه و خشم					
۱۱۵۴		آشیانه و خشم					
۱۱۵۵		آشیانه و خشم					
۱۱۵۶		آشیانه و خشم					
۱۱۵۷		آشیانه و خشم					
۱۱۵۸		آشیانه و خشم					
۱۱۵۹		آشیانه و خشم					
۱۱۶۰		آشیانه و خشم					
۱۱۶۱		آشیانه و خشم					
۱۱۶۲		آشیانه و خشم					
۱۱۶۳		آشیانه و خشم					
۱۱۶۴		آشیانه و خشم					
۱۱۶۵		آشیانه و خشم					
۱۱۶۶		آشیانه و خشم					
۱۱۶۷		آشیانه و خشم					
۱۱۶۸		آشیانه و خشم					
۱۱۶۹		آشیانه و خشم					
۱۱۷۰		آشیانه و خشم					
۱۱۷۱		آشیانه و خشم					
۱۱۷۲		آشیانه و خشم					
۱۱۷۳		آشیانه و خشم					
۱۱۷۴		آشیانه و خشم					
۱۱۷۵		آشیانه و خشم					
۱۱۷۶		آشیانه و خشم					
۱۱۷۷		آشیانه و خشم					
۱۱۷۸		آشیانه و خشم					
۱۱۷۹		آشیانه و خشم					
۱۱۸۰		آشیانه و خشم					
۱۱۸۱		آشیانه و خشم					
۱۱۸۲		آشیانه و خشم					
۱۱۸۳		آشیانه و خشم					
۱۱۸۴		آشیانه و خشم					
۱۱۸۵		آشیانه و خشم					
۱۱۸۶		آشیانه و خشم					
۱۱۸۷		آشیانه و خشم					
۱۱۸۸		آشیانه و خشم					
۱۱۸۹		آشیانه و خشم					
۱۱۹۰		آشیانه و خشم					
۱۱۹۱		آشیانه و خشم					
۱۱۹۲		آشیانه و خشم					
۱۱۹۳		آشیانه و خشم					
۱۱۹۴		آشیانه و خشم					
۱۱۹۵		آشیانه و خشم					
۱۱۹۶		آشیانه و خشم					
۱۱۹۷		آشیانه و خشم					
۱۱۹۸		آشیانه و خشم					
۱۱۹۹		آشیانه و خشم					
۱۱۱۰		آشیانه و خشم					
۱۱۱۱		آشیانه و خشم					
۱۱۱۲		آشیانه و خشم					
۱۱۱۳		آشیانه و خشم					
۱۱۱۴		آشیانه و خشم					
۱۱۱۵		آشیانه و خشم					
۱۱۱۶		آشیانه و خشم					
۱۱۱۷		آشیانه و خشم					
۱۱۱۸		آشیانه و خشم					
۱۱۱۹		آشیانه و خشم					
۱۱۱۲۰		آشیانه و خشم					
۱۱۱۲۱		آشیانه و خشم					
۱۱۱۲۲		آشیانه و خشم					
۱۱۱۲۳		آشیانه و خشم					
۱۱۱۲۴		آشیانه و خشم					
۱۱۱۲۵		آشیانه و خشم					
۱۱۱۲۶		آشیانه و خشم					
۱۱۱۲۷		آشیانه و خشم					
۱۱۱۲۸		آشیانه و خشم					
۱۱۱۲۹		آشیانه و خشم					
۱۱۱۳۰		آشیانه و خشم					
۱۱۱۳۱		آشیانه و خشم					
۱۱۱۳۲		آشیانه و خشم					
۱۱۱۳۳		آشیانه و خشم					
۱۱۱۳۴		آشیانه و خشم					


ادامه جدول شماره ۳۰

شماره هر باب بومی	نحوه استفاده	خواص دارویی	آندام مور استفاده	نمک محلی	نام فارسی	نام علمی	خانواده
۱۷۰۸	جوشانده (خوارکی)	درمان بیوت	برگ و سرشاره	برگ های نازد	فروز	<i>Polygonum aviculare L.</i>	Polygonaceae
۱۶۹۹	خام، پخته و طعم دهنده (خوارکی)	همه بیماری های رفع عطش، کاهش هضم بستر غذا، بذر	غفرود	غفرود	دویاس	<i>Rheum ribes L.</i>	
۱۷۵۶	چربی خون درمان بیوت	دویان بیوت و دل درد، درمان چوش های صورت و برقان	برگ و رشه	برگ های نازد	ترشک خراسانی، ترشی آسیایی	<i>Rumex thianschanicus Losinsk.</i>	
۱۶۵۹	خام و پخته (خوارکی)	فداهال، تصفیه کننده خون، خشک کشنه بدن و قلب بر	برگ و ساقه	سبخ نروش	ترشک ایرانی	<i>Rumex chalepensis Mill.</i>	
۱۱۰۲	خام (خوارکی)	دویان بیوت، تقویت روده، معدود درمان التهابات مجاری ادرار	برگ و ساقه های	خمله	خرفه	<i>Portulaca oleracea L.</i>	Portulacaceae
۱۱۱۴	خام و پخته (خوارکی)	دویان درد مفاصل	برگ های نازد	علف	آلان	<i>Ranunculus arvensis L.</i>	Ranunculaceae
۱۱۰۹	خام و پخته (خوارکی)	مسک دردهای مفاصل درمان ناراحتی های رودی	برگ	ادوگی	نوت زیباصی	<i>Sangiusorba minor Scop.</i>	Rosaceae
۱۰۹۸	ضماد (استعمال خارجی)	مدود، درمان سردو و تقویت مو، التیام زخم	برگ و رشه	معضنی	رویانس	<i>Rubia tinctorum L.</i>	Rubiaceae
۱۰۸۸	جوشانده (خوارکی)	نسکین دود و الشام زخم درمان کرم خونی و دل درد	برگ و کل	دم گاو	گل ماهور اردبیلی	<i>Verbascum thapsus L.</i>	Scrophulariaceae
۱۱۲۷	ضماد (استعمال خارجی)	دویان نایل های برشی، نسب بر	برگ و ساقه	عروس د	گل معزوف سایه	<i>Seriphularia umbrosa Dumort.</i>	
۱۲۲۴	دویش (خوارکی)	تفطیل، قاعده کی، نسکین درد ناشی از آن، درمان نایل و لوری	میوه	سرمه	عروسک پشت پرده	<i>Physalis alkekengi L.</i>	Solanaceae
۱۲۰۹	ضماد (استعمال خارجی)	دویان نایل های برشی، نسب بر	میوه و برگ	سکنیکل	تاجزیزی، سک	<i>Solanum nigrum L.</i>	
۱۲۲۸	ضماد (استعمال خارجی)	دویان تورم و درد مفاصل، ادویه ادو و رفع عفونت های مجاری ادرار	برگ و سرشاره	ترکی	لکن	<i>Urtica dioica L.</i>	Urticaceae
۱۲۴۳	جوشانده (خوارکی)	حلطا اور و صدیف، صدحاسابت	برگ و کل	ترکی	گزنه سه رنگ	<i>Viola tricolor L.</i>	Violaceae
۱۰۷۰	ضماد (استعمال خارجی)	الیام زخم، درد استخوان، جلوگیری از دریش مو	رض و برگ های	سرمش	سرمش زرین	<i>Eremurus stenophyllos (Boiss. & Buhse) Baker.</i>	Xanthorrhoeaceae







شکل شماره ۴- پرجمعیت‌ترین خانواده‌های گیاهی منطقه مورد مطالعه



شکل شماره ۵- اندام گیاهی مورد استفاده و درصد آنها



شکل شماره ۶- فراوانی ثبت (FC) گیاهان دارویی منطقه زیرخان برای گیاهانی که بالاترین میزان فراوانی ثبت را داشته‌اند (فراوانی ثبت: تعداد افراد آگاه بومی که کاربرد گونه‌ی گیاهی را بیان کرده باشند)




شکل شماره ۷- فراوانی ثبت نسبی گیاهان بومی زیرخان برای گیاهانی که بالاترین میزان فراوانی نسبی ثبت را داشتند (فراوانی ثبت نسبی از تقسیم گونه های آگاه بومی منطقه به دست می آید)

خانواده و در بررسی های دولتخواهی و همکاران ۹۱ گونه متعلق به ۳۹ خانواده جمع آوری شد که در هر سه بررسی خانواده های Apiaceae و Lamiaceae بیشترین سهم را داشتند.

نتایج حاصل از بررسی کاربرد سنتی گیاهان نشان داد که برای مقابله با اثرات بیماری های شناخته شده از گیاهان دارویی منطقه مورد مطالعه، استفاده های دارویی متنوعی صورت می گیرد و مشخص شد که بیشترین استفاده دارویی از گیاهان جهت درمان بیماری های گوارشی، درمان سرماخوردگی، خلط آور، تب بر، نرم کننده سینه، درمان بیماری های عصبی، مسكن و آرامبخش می باشد و کمترین میزان استفاده از گیاهان منطقه مربوط به رفع کم خونی، تصفیه خون و کاهش فشار خون، درمان بیماری قند و چربی خون و ضد عفونی کننده می باشد (شکل شماره ۸). نتایج تحقیقات برخی از محققین در استان خراسان رضوی و خراسان شمالی نیز مؤید این مطلب است که بیشترین استفاده دارویی از گیاهان جهت درمان انواع بیماری های گوارشی، عفونی و سرماخوردگی می باشد چنانکه علی میرزایی و همکاران [۴۶] در استان خراسان رضوی دریافتند که ۴۳/۱۴ درصد از گیاهان به منظور درمان بیماری های گوارشی و ۲۳/۵۳ درصد از گیاهان در جهت درمان بیماری های مرتبط با سرماخوردگی (تب، گلو درد و سرفه) مورد استفاده قرار می گیرند؛ همچنین حبیبی و همکاران

بحث

در این مطالعه گیاهان جمع آوری شده متعلق به ۲۹ خانواده بودند که در این بین خانواده های Lamiaceae، Brassicaceae، Compositae، Apiaceae، Polygonaceae از بیشترین سهم برخوردار بودند. علی میرزایی و همکاران [۴۶] نیز در بررسی داشت بومی گیاهان دارویی مرتع چهل کمان استان خراسان رضوی نیز دریافتند که بیشترین سهم گیاهان دارویی مورد استفاده جوامع محلی مربوط به خانواده های Lamiaceae، Apiaceae و Brassicaceae می باشد؛ همچنین سجادی و همکاران [۴۷] در نتایج تحقیق خود که در بردارنده جمع آوری و بررسی مصارف سنتی منتخبی از گیاهان شهرستان کاشان بود به این امر پی بردنند که از کل گونه های جمع آوری شده عمده ترین مصارف سنتی مربوط به گونه هایی از خانواده نعنایان (Lamiaceae)، چتریان (Apiaceae) و کاسنی (Compositae) می باشد. برخی از بررسی ها در مناطق با شرایط اقلیمی مشابه نظری بررسی های فروزه و همکاران [۱۲] در استان کهگیلویه و بویراحمد، رزمجويي و همکاران [۴۸] در شهرستان بهبهان، استان خوزستان و همچنین دولتخواهی و همکاران [۴۹] در شهرستان کازرون استان فارس نیز گویای نتایج مشابهی است. چنانکه در بررسی فروزه و همکاران ۷۰ گونه از ۳۰ خانواده و در بررسی رزمجويي و همکاران نیز ۶۰ گونه ی گیاهی متعلق به ۲۳



شکل شماره ۸- نمودار فراوانی تعداد گونه‌های دارویی مورد استفاده در درمان ستی بیماری‌ها

باشد. رزمجویی و همکاران [۴۸] نیز در مطالعه شناسایی، خواص درمانی و نحوه استفاده برخی گیاهان دارویی شهرستان بهبهان در استان خوزستان اذعان نمودند که برگ گیاهان با ۲۷ درصد از بیشترین میزان مصرف دارویی برخوردار است که با نتایج مشی و همکاران [۵۳]، نیکنژاد و همکاران [۵۴]، فروزه و همکاران [۵۵] و دیفرخش [۲۸] مطابقت دارد.

طبق بررسی‌های صورت گرفته خانواده نعنایان (Lamiaceae) در زمرة خانواده‌ای است که بیشترین فراوانی ثبت را به خود تخصیص داده‌اند. این نتایج با بررسی‌های لاوری و همکاران [۵۶]، مرادی و همکاران [۵۷] و قاسمی دهکردی و همکاران [۵۸] مطابقت دارد. همچنین یافته‌های علی میرزاوی [۴۶] در مراتع چهل کمان استان خراسان رضوی نیز گویای آن است که بیشترین فراوانی ثبت به گونه‌هایی از خانواده Lamiaceae تعلق دارد.

بررسی و مقایسه کاربردهای مختلف گیاهان در منطقه مورد مطالعه و همچنین سایر نقاط ایران تشابه موارد مصرف در میان گونه‌های گیاهی مشابه در مناطق مختلف کشور را به اثبات می‌رسانند. به عنوان مثال در تحقیق دیگری که در استان خراسان رضوی صورت گرفته است، کاربردهای مشابهی برای برخی از

[۵۰] در بررسی انتوبوتانی گیاهان پرمصرف شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی به نتایجی مشابه دست یافتند. تبد و جلیلیان [۵۱] نیز در بررسی گیاهان دارویی منطقه زریوی شهرستان مربیوان نیز اظهار می‌دارند که بیشترین استفاده دارویی از گیاهان، به درمان بیماری‌های گوارشی و ناراحتی‌های مجاری تنفسی مربوط می‌باشد و پس از آن استفاده از گیاهان برای درمان بیماری‌های پوستی و بیماری‌های مربوط به دستگاه عصبی در درجات بعدی اهمیت قرار می‌گیرند. پژوهش‌های دولت‌خواهی و نبی‌پور [۲۳] در حوزه‌ی شمال شرقی خلیج فارس و سعادتپور و همکاران [۲۴] نیز در مراتع سجاسروド زنجان نیز مؤید این مطلب است که بیشترین کاربرد محلی گیاهان مربوط به بیماری‌های گوارشی است؛ همچنین این نتایج با نتایج بررسی‌های مردانی نژاد و وزیرپور [۲] در منطقه‌ی مبارکه‌ی اصفهان و خدایاری و امانی [۵۲] در خوزستان مطابقت دارد و گویای این است که در مناطق بررسی شده نیز بیشترین کاربرد گیاهان دارویی در جوامع محلی برای درمان بیماری‌های گوارشی معرفی شده است.

نتایج گویای آن است که بیشترین کارکرد اندام‌های مصرفی گیاهان شامل سرشاخه‌های گلدار، برگ و ساقه‌های جوان می‌

اغلب گیاهان خودروی دارویی در مناطق مختلف تقریباً دارای کارکرد مشابه خوراکی و دارویی در میان جوامع محلی هستند. نتایج این بررسی مبین آن است که جوامع محلی روستایی و عشاير به دلیل کمبود نیروی انسانی آموزش دیده و کمبود تسهیلات بهداشتی و عدم دسترسی مناطق دور افتاده به امکانات بهداشتی، قادر به استفاده از امکانات بهداشتی نخواهند بود از این‌رو استفاده از گیاه درمانی نه تنها یک اولویت بلکه یک انتخاب اجتناب‌ناپذیر و بدون جایگزین برای این جوامع است. در این مناطق نیاز به تحقیقات دقیقی نسبت به گیاهانی که صدها سال توسط بومیان با موفقیت در درمان امراض مختلف استفاده می‌شوند، احساس می‌شود [۶۴]. علاوه‌بر این امروزه در تمام دنیا توجه خاصی به گیاهان دارویی به دلیل دسترسی آسان، هزینه کم و مهم‌تر از همه عدم ایجاد عوارض جانبی به وجود آمده است، به گونه‌ای که بزرگان علم داروسازی، قرن پیشترم را قرن بازگشت به طبیعت و استفاده از داروهای گیاهی نام نهاده‌اند [۶۵]. علاوه بر این بسیاری از داروهایی که امروزه تجویز می‌شوند از گیاهان مشتق شده‌اند. چنانکه یک چهارم از داروهای مرسوم که حدود ۱۲۰ داروی جدید نسخه شده را شامل می‌شود حداقل حاوی یک ترکیب فعال مشتق شده از گیاهان می‌باشد. طبیعت اطراف ما سرشار از گونه‌های گیاهی ناشناخته از نظر خواص دارویی و درمانی است که برای کشف خواص آنها ممکن است به سال‌ها وقت نیاز باشد [۶۶]. گاهی در برخی مناطق از گونه‌های گیاهی خاصی به عنوان گیاه دارویی استاده می‌شود که هنوز علوم جدید به آنها دست نیافته است و با استفاده از تجربه اهالی بومی می‌توان به این مهم دست یافت [۲۳]. لذا نتایج این بررسی و سایر تحقیقات مشابه می‌تواند پتانسیل مناطق موردن مطالعه را از نظر ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی مشخص ساخته و بستر مناسبی را برای بسط فعالیت‌های تحقیقاتی و فراهم آوردن زمینه مناسب برای استفاده بهتر از دانش بومی و گیاهان دارویی برای تولید فرآورده‌هایی با اثر بخشی بیشتر و مضرات کمتر فراهم نماید.

گونه‌ها به چشم می‌خورد. چنانکه در هر دو مطالعه گونه *Malva neglecta* برای درمان سرفه، گلو درد و ضدسرماخوردگی، گونه *Achillea millefolium* به عنوان تب بر، رفع دلپیچه و دل درد و همچنین *Heracleum persicum* به منظور درمان نفخ و ضدغوفونی کننده محیط مورد استفاده واقع می‌شود [۴۶]. مرور تحقیقات صورت گرفته پیرامون دانش بومی گیاهان دارویی در سایر نقاط کشور و مقایسه آن با تحقیق حاضر نیز گویای کارکردهای مشابهی برای برخی از گیاهان می‌باشد. به عنوان مثال یافته‌های این تحقیق گویای آن است که گیاهانی نظیر *Mentha Althaea officinalis Allium ampeloprasum* و *Stachys lavandulifolia* امراضی مانند بیوست، تقویت موی سر، کمک به هضم بهتر غذا و درمان سرماخوردگی مورد استفاده جوامع محلی قرار می‌گیرند. این نتایج با یافته‌های فروزه و همکاران [۵۵] و دیفرخشن [۲۸] در بررسی مصارف سنتی گیاهان دارویی برخی از مراتع بیلاقی استان کهگیلویه و بویراحمد مطابقت دارد؛ همچنین گیاهانی نظیر *Capparis spinosa* و *Cichorium intybus* که به ترتیب به منظور تصفیه کننده خون و تسکین تورم و درد مفاصل به کار می‌روند، دارای کارکرد مشابهی در دانش محلی بهره‌برداران شهرستان کازرون در استان فارس می‌باشند [۴۹].

گیاهان *Cichorium intybus Heracleum persicum* و *Mentha longifolia* نیز دارای مصارف سنتی مشابهی در منطقه مورد مطالعه و دهستان زارمود نکا در استان مازندران می‌باشند [۵۹]. این نتایج گویای آن است که در مناطق مختلف ایران فرهنگ‌ها و رسوم متنوعی در زمینه استفاده از گیاهان وجود دارد که گرچه این تفاوت فرهنگ‌ها سبب گوناگونی هرچند اندک کاربردهای ذکر شده توسط مردم از یک گونه می‌شود، اما در اغلب موارد این کاربرد و موارد استفاده شبیه یکدیگر می‌باشند. نتایج بررسی‌های جاویدتاش [۶۰]، ذوالفاری و همکاران [۶۱]، دیفرخشن [۲۸]، مقصودی و صالحی [۶۲] و سعادتپور [۶۳] نیز مؤید این مطلب است که



منابع

1. Bandani M, Mirloffi M and Sheibani shad A. The study of the role of indigenous knowledge in agriculture and the development process. National Conference on Civil Engineering and Architecture with Focus on Sustainable Development. 2015, 11 pp. (Persian).
2. Mardaninejad SH and Vazirpour M. Study of ethnobotany of medicinal plants by People of Mobarakeh in the Esfahan province. *J. Herbal Drugs* 2012; 2: 111-29. (Persian).
3. Mirdeilami Z, Heshmati Gh, Barani H. Study of ethnobotany and ethnoecology of medicinal plant species (CaseStudy: Kichik rangelands in North East Golestan province). *J. Indigenous Knowledge*. 2014; 1: 125-50. (Persian).
4. Pazhuuhan A and Habibi Qahfarkhi N. The role of water resources management in sustainable agricultural development, Second National Conference of The development sustainable agricultural systems. Hamedan, Tomorrow's Environment Society, 2013, 13 pp. (Persian).
5. Emadi MH and Abbasi A. Old wisdom in the modern era: The application of indigenous knowledge in sustainable agricultural development. Research Center for Rural Issues, Tehran: Ministry of Jihad-e-Agriculture.1999, 234 pp. (Persian).
6. Sadeghloo T and Azizi Demirchilo A. Assessment of the effect of indigenous knowledge on sustainable agricultural development (Case Study, Gogh Tape in Bile Savar). *J. Rural Research*. 2015; 6(2): 389-410. (Persian).
7. Shah hosseini A. Documentation of indigenous knowledge in Hableh Roud. Omran Publication. 2014, 177 pp. (Persian).
8. Azkia M, Mirshekar A. Indigenous knowledge, public participation and the way to use in exploiting the surface water in Dasht yari area. *J. Forest and Rangelands* 1997; 34:1 (Persian).
9. Adhami H R, Mesgarpour B, Farsam H. Medicinal plants in Iran. *JMP*. 2007, 74: 34-43. (Persian).
10. Azkia M andSafaryshal R. A systemic attitude towards the culture of villagers (As a necessity in sustainable rural development). *J. Forest and Rangeland*. 1999; 42:84.
11. Frouzeh MR. Investigation on ethnobotany and habitat suitability prediction of some important range species (Case Study: Dilegan Rangeland, kohgiloye and Boirahmad province), A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Ph.D. in Rangeland Sciences, Gorgan University. 2015, 350 pp. (Persian).
12. Frouzeh MR, Heshmati Gh, Barani H. Investigation on the knowledge of food preparation using edible plants. *Iranian J. Indigenous Knowledge* 2014; 4(9): 109-29. (Persian).
13. Difrakhsh SM, Barani H, Pour Rezaie J. Ethnography of non-crop plants in Deli-Kama (Mountainous valley in central Zagros). *J. Social Sciences* 2014; 67: 153-207. (Persian).
14. Reddy CS, Reddy KN, Murthy EN and Raju VS. Traditional medicinal plants in Seshachalam hills, Andhra Pradesh, India. *J. Medicinal Plants Research*. 2009; 5: 408-12.
15. Panghal M, Arya V, Yadav S, Kumar S and Yadav JP. Indigenous knowledge of medicinal plants used by Saperas community of Khetawas, Jhajja District, Haryana, India. *J. Ethnobiology and Ethnomedicine* 2010; 6:4.
16. Irum Naz M and Tamoor-ul-Hassan A. Ethnobotanical investigation of medicinal flora used by indigenous people in district Attock, Pakistan. *J. Advanced Botany and Zoology* 2014; 4:1-7.
17. Khodayari H, Amani Sh and Amiri H. Ethnobotany of medicinal plants in the Northeast of Khoozestan Province. *EJMP*. 2014; 8(4): 12-25. (Persian).



- 18.** El-Hilaly J, Hmammouchi M and Lyoussi B. Ethnobotanical studies and economic evaluation of medicinal plants in Taounate province (Northern Morocco). *J. Ethnopharmacology* 2003; 86: 149-58.
- 19.** Goleniowski ME, Bongiovanni GA, Palacio L, Nunez CO and Cantero JJ. Medicinal plants from the "Sierra de Comechingones", Argentina. *J. Ethnopharmacology* 2006; 107:324-41.
- 20.** Albuquerque UP, Medeiros PM, Almeida ALS, Monteiro JM, Neto EMFL and Melo JG. Santos J. Medicinal plants of the Caatinga (semi-arid) vegetation of NE Brazil: A quantitative approach. *J. Ethnopharmacology* 2007; 114: 325-54.
- 21.** Parveen B, Upadhyay RSh and Kumar A. Traditional uses of medicinal plants among the rural communities of Churu District in the Thar Desert, India. *J. Ethnopharmacology* 2007; 113: 387-99.
- 22.** Tene V, Malagon O, Finzi PV, Vidari G, Armijos C and Zaragoza T. An ethnobotanical survey of medicinal plants used in Loja and Zamora-Chinchipe, Ecuador. *J. Ethnopharmacology* 2007; 111: 63-81.
- 23.** Dolatkhahi M and Nabi pour I. An Ethanobotanic Study of Medicinal Plants in the Northeast Basin of the Persian Gulf, Quarterly Journal of Medicinal Plants, 2013, 13(2): 129-43. (Persian).
- 24.** Saadatpour M, Barani H, Abedi sarvestani A and Froozeh MR. Ethnobotanic study of medicinal plants in Sajasrood (Zanjan province). *J.Medicinal Plants* 2017; 8(3). 185-93. (Persian).
- 25.** Ahvazi M, Mozaffarian V, Nejhadsattari T, Mojab F, Charkhchian MM, Khalighisigharoodi F and Ajani Y. The use of traditional medicinal plants of Lamiaceae and Rosaceae in Alamut Ghazvin. *JMP*. 2007; 64(24): 128-35. (Persian).
- 26.** Department of Natural Resources of Khorasan Razavi Province, Range management Plan of Dar Roud 2006.
- 27.** Report of the Meteorological Office of Neishabour, 2013.
- 28.** Difrakhsh SM. An investigation on indigenous knowledge (ethnobotany and ethnoecology) of the most important non-forage species (edible, medicinal and industrial) in Deli-Kama region (Kohgiloye and Boirahmad province). M.Sc thesis in Range management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 2013, 168 pp. (Persian).
- 29.** Mozaffarian VA. A dictionary of Iranian plant names. Farhang moaser publication. 1998, 596 pp. (Persian).
- 30.** Assadi M, Maassoumi AA, Khatamsaz M and Mozaffarian V. Flora of Iran. Research Institute of Forests and Rangeland Press. Tehran. 1990 - 2010, Vol 1 – 58, 4500 pp. (Persian).
- 31.** Ghahraman A, Attar F. Biodiversity of plant species in Iran. Tehran University press, Tehran. 1999, Vol 1. 1176 pp. (Persian).
- 32.** Ghahraman A. Flore de l'Iran. Société nationale pour la conservation des ressources naturelles et de l'environnement humain avec la collaboration de l'Université de Tehran. 1978, Vol. 1 - 26. 3250 pp.
- 33.** Ghahraman A. Plant Systematics - Chromophytes of Iran. Tehran University Press. Tehran. 1992 - 1996, Vol 1 - 4. 2778 pp. (Persian).
- 34.** Parsa A. Flora of Iran. National Scientific Research Council, Ministry of Science, Culture and Education. Tehran. 1978 - 80, Vol. 1 - 2. 1048 pp. (Persian).
- 35.** Mobayen S. Flora of Iran. Tehran University Press. 1979 - 1989, Vol. 1 - 4. 2024 pp. (Persian).
- 36.** Rechinger KH. (ed.) Flora Iranica. Akademische Druck-u Verlagsanstalt, Graz. 1963-2005, Vol. 1 - 178. 17136 pp.
- 37.** Boisseir E. Flora Orientalis, A. Asher and Co.B. V. Amsterdam. 1867 - 1888. Vol. 1 - 6. 5819 pp.
- 38.** Zohary M and Feindbrun-Dotyhan N. Flora Palestina. The Israel Academy of Sciences and



- Humanities Press. Jerusalem. 1966 - 1986. Vols. 1-3. 1334 pp.
- 39.** Delnavaz Hashemlouian B and Ataii Azimi A. Medicinal and Edible Attributes in Plants, Islamic Azad University Press. Saveh. 2008, 180 pp. (Persian).
- 40.** Zargari A. Medicinal Plants, 6th ed. Tehran University Press. Tehran. 1997, Vol 1 - 5. 4854 pp. (Persian).
- 41.** Mir-Heidar H. Plant Learning, Usage of plants in prevention and treatment of disease, 5th ed. Daftare- Nashre- Farhange-Islami. Tehran. 2002, Vol 1 - 5. 2698 pp. (Persian).
- 42.** Azad Bakht M. Medicinal Plant classification. Teimour zadeh publication, Tehran. 2000, 4040 pp. (Persian).
- 43.** Mozaffarian VA. Identification of Medicinal and Aromatic Plants of Iran. Tehran Publication: Farhang Moaser. 2013, 1444 p. (Persian).
- 44.** Farhadi M. Ethnography of indigenous knowledge and technologies, Iranians Nan-e-Shab. *J. Namaye Pajouhesh* 2006. (Persian).
- 45.** Alavi Zade AM, Mir Lotfi MR, Norouzi M and Hosseini N. The effect of virtual social networking on the improvement of farming productivity (Case study: Zebarkhan in Neishabour), *J. Spatial Planning*. 2015, 4 (5): 39-56. (Persian).
- 46.** Alimirzaei F, Mohammadi Kalayeh A, Shahraki MR and Behmanesh B. Local knowledge of medicinal plants from the point of view of nomads in the rangelands of Chehel-Kaman, North Khorasan province. *J. Indigenous Knowledge*. 2017; 4: 156- 201. (Persian).
- 47.** Sajjadi S, Batooli H and Ghanbari A. Collection, evaluation and ethnobotany of Kashan medicinal plants. *J. Islamic Iranian Traditional Medicine*. 2011; 2 (1): 29-36. (Persian).
- 48.** Razmjoue D, Zarei Z, Armand R. Ethnobotanical Study (Identification, Medical Properties and How to Use) of some Medicinal Plants of Behbahan city of Khuzestan Province, Iran. *JMP*. 2018; 4 (64): 33-49. (Persian).
- 49.** Dolatkhahi M, Ghorbani Nohooji M, Mehrafarin A, Amini Nejad G, Dolatkhahi A. Ethnobotanical Study of Medicinal Plants in Kazeroon, Iran: Identification, Distribution and Traditional Usage. *JMP*. 2012; 2 (42): 163-178. (Persian).
- 50.** Habibi M, Soleiman S, Gholamali Pour E and Jorjani I. Investigation the ethnobotany of medicinal plants in Marivan. The First Conference of National Resources Management. 2013, 8pp. (Persian).
- 51.** Tabad M, Jalilian N. Ethnobotanical Study of Medicinal Plants in Zarivar Region (Marivan), Iran. *JMP*. 2015; 2 (54): 55-75. (Persian).
- 52.** Khodayari H and Amani SH. Ethnobotanical study about medicinal plants in Ize (Khuzestan Province). The first national conference on medicinal herbs, traditional medicine and organic farming, Hamadan, Assessment Board of Hegmataneh Environmental, Centre for Development Conferences Aria Hegmatan. COI: HBHEATH01_161. 2015; 1-15. (Persian).
- 53.** Moshi MJ, Otieno DF and Weisheit A. Ethno medicine of the Kagera Region, north western Tanzania. Part 3: plants used in traditional medicine in Kikuku village, Muleba District. *J. Ethnobiology and Thnomedicine*. 2012, 8 (14): 2-11.
- 54.** Niknejad Y, Rezaee MB and Zakerimehr M.R. Florestic investigation, life form, and distribution of medicinal plants species in Rineh area Amol. Eco Phytochemical *JMP*. 2014, 1 (4): 32 – 43. (Persian).
- 55.** Frouzeh MR, Heshmati Gh and Barani H. Collection and analysis of some plant species in kohgiloye and Boirahmaad province, *J. Traditional Medicine in Islam and Iran*. 2014. 5: 131-139. (Persian).
- 56.** Lavari N, Ghasemi M and Nabipour I. Ethnopharmacology of medicinal plants in the Southwest of Mond Mountain. *J. of Iran South Med*. 2017; 20 (4):380-98. (Persian).



- 57.** Moradi L, Dolatkhahi M, Darabi H and Nabi pour I. Ethnopharmacology of Medicinal Plants in Genaveh Port. *J. Iran South Med.* 2014; 17 (5):959-73. (Persian).
- 58.** Ghasemi Dehkordi N, Ghanadian M, Ghaem Maghami L and Sajadi Far S. Collection, identification and evaluation of traditional uses of some plants in the Rokh area in Chaharmahal and Bakhtiari province. *J. Traditional medicine in Islam and Iran.* 2015; 6 (1): (Persian).
- 59.** Gholipour A, Ghorbani Nohooji M, Rasuli N, Habibi M. An Ethnobotanical Study on the Medicinal Plants of Zarm-rood Rural District of Neka (Mazandaran Province). *JMP.* 2014; 4 (52): 101-121. (Persian).
- 60.** Javidtash A. Medicinal plants of Fars province. *J. of Researches of Medicinal and Aromatic Plants.* 2001; 148: 103-11. (Persian).
- 61.** Zolfaghari B, sadeghi M, Thierry A and YousufAli Tabar M. Collecting, reviewing and study about traditional uses of plants in Babol. *J.Traditional Medicine in Islam and Iran.* 2012; 1: 113-22. (Persian).
- 62.** Maghsudi M and Salehi P. Study about ethnobotany in Evan area. *J. Social Sciences.* 2014, 67: 244-72. (Persian).
- 63.** Saadatpour M. Study about indigenous knowledge (Ethnobotany and ethnoecology) of the most important forage and non-forage (edible, medicinal, industrial) plant species in Sojasaroud (Zanjan province). M.Sc thesis in Range management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 2017, 160 pp. (Persian).
- 64.** Qureshi R and Ghufran MA. Indigenous knowledge of selected medicinal wild plants of district attock, punjab, Pakistan. *Pakistan J. of Botany.* 2007; 7: 2291-9.
- 65.** Sartavi K and Gholamian F. Medicinal plants of Bushehr province. *Iranian J. of Medical and Aromatic Plants.* 2004: 20(2): 213-27. (Persian).
- 66.** Ahvazi M, Mozaffarian V, Nejadsatari T, Mojab F, Charkhchiyan MM, Khalighi-Sigaroodi F and Ajani Y. Medicinal application of native plants (Lamiaceae and Rosaceae Family) in Alamut region in Ghazvin province. *JMP.* 2008; 24: 74 - 84. (Persian).
- 67.** Dolatkhahi M, Ghorbani Nohooji M. The Most Used Medicinal Plant Species of Dashtestan (Bushehr Province), with Emphasize on Their Traditional Uses. *JMP.* 2013; 2 (46): 85-105 . (Persian).



Identification and Investigation of Ethnobotany of Some Medicinal Plants in Razavi Khorasan Province

Hosseini M (M.Sc.)¹, Rahim Forouzeh M (Ph.D.)^{1*}, Barani H (Ph.D.)¹

1- Department of Rangeland Management, Gorgan University of Agricultural sciences & Natural Resources, Gorgan, Iran.

*Corresponding author: Department of Rangeland Management, Gorgan University of Agricultural sciences & Natural Resources, Basij Square, Gorgan, Iran.

Tel: +98-9173045263, Fax: +98- 17- 32220640

Email: rfroozeh@gmail.com

Abstract

Introduction: Ethnobotany, as a part of every region's national capital, contains local beliefs and knowledge about plants and their characteristics being the result of centuries of trial and error in the natural environment. Though, it is unwritten and exposed to degeneration.

Purpose: The purpose of this study was to acquire and document the culture of traditional use of Zebarkhan rangeland medicinal plants from Neyshabur in Razavi Khorasan province.

Method: In this study, the traditional knowledge of the people about the plants was collected in free interviewing and participatory observations. Questions posed about local names, growth form, harvest methods, organ usages and properties of plants. Interviews then went on until the repeated responses confirmed the reliability and validity. Collected Plants were identified by applying valid botanic sources.

Conclusion: In this study, 70 medicinal plant species belonging to 29 families were identified. The largest proportion of plant species were respectively related to Lamiaceae, Apiaceae, Brassicaceae and Polygonaceae. Among traditional uses, the most belonged to diseases treatment related to digestive, colds, neurological problems and sedation. The most commonly used organs were floral branches, leaves and young stems. Investigating and comparing different uses of plants in the study area as well as the other parts of Iran proves the similarity usage of similar plant species in different regions of the country.

Result: The existence of 70 medicinal plants in Neyshabur rangelands confirms the richness of this region, so identification and documentation of their indigenous knowledge can pave the way for a better usage of medicinal plants and their products.

KeyWords: Indigenous knowledge, Ethnobotany, Medicinal plants, Participatory observation, Zebarkhan.

