

مقایسه اثرات دیاکسید سلنیم و ماده موثره چای سبز (EGCG) بر سطح سرمی لیپیدها در موش صحرایی

غلامعلی نادری^{۱*}، سالار بختیاری^۲، افشنین الماسی^۳، سانا ز جوانبخشی^۴، رسول موخواه^۵

۱- استادیار، گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

۳- دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

۴- دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

۵- دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

*آدرس مکاتبه: تهران، دانشگاه شاهد، دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۷۴۳۵

تلفن: (داخلی ۲۲۶) ۸۸۹۶۳۸۴۹ (۰۲۱)، نمایش: ۸۸۹۶۳۱۰ (۰۲۱)

پست الکترونیک: mdnaderi@yahoo.com

تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۳/۱۰

تاریخ دریافت: ۱۳۸۳/۱۱/۳

چکیده

مقدمه: کاتشین‌ها که از اجزای مواد موثر چای سبز هستند دارای خواص آنتیاکسیدانی قوی و کاهش‌دهنده لیپیدهای سرمی می‌باشند. از جمله این کاتشین‌ها اپی‌گالوکاتشین-۳-گالات (EGCG) می‌باشد. سلنیوم کوفاکتور آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز است نیز دارای خواص آنتیاکسیدانی می‌باشد.

روش بررسی: در این تحقیق ۲۰ موش صحرایی از نژاد Wisrar انتخاب و با رژیم غذایی پرچرب به مدت ۴ هفته تغذیه شدند. سپس از موش‌ها نمونه خونی تهیه شد و سطح سرمی لیپیدهای آنها با استفاده از کیت اندازه‌گیری شد. ۱۵ موش انتخاب و به ۳ گروه ۵ تایی تقسیم شدند. هر سه گروه با همان رژیم غذایی پرچرب تغذیه گشتند. گروه اول به عنوان کنترل انتخاب شد. به گروه دوم EGCG و به گروه سوم SiO₂ تزریق شد. پس از دو هفته مجدداً از موش‌ها نمونه خونی تهیه و سطح سرمی لیپیدهای آنها اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: EGCG باعث کاهش بیشتر سطح سرمی کلسترول نسبت به SiO₂ می‌شود و به طور قابل توجهی با کنترل تفاوت دارد (p < 0.05). همچنین EGCG اثرات قوی‌تری در افزایش HDL-کلسترول و کاهش تری‌گلیسرید سرم نسبت به SiO₂ دارد.

بحث: اگرچه EGCG و SiO₂ باعث کاهش سطح سرمی لیپیدهای ذکر شده می‌شوند ولی EGCG به طور کلی دارای اثرات کاهش‌دهنده قوی‌تری است که بیشترین اثر آن در کاهش کلسترول است. به نظر می‌رسد که استفاده از EGCG به عنوان داروی کاهش‌دهنده کلسترول در افراد با اختلالات هیپرکلسترولمیا و یا هیپرلیپیدمیا می‌تواند مفید باشد.

گل واژگان: کاتشین، اپی‌گالوکاتشین-۳-گالات، آنتیاکسیدان، رژیم غذایی پرچرب

مقدمه

بودند، استفاده شد. این موش‌ها در سیکل روشناجی / تاریکی (۱۲/۱۲)، درجه حرارت 21 ± 2 درجه سانتی‌گراد و با دسترسی آزاد به آب و غذا نگهداری شدند.

مواد

دیاکسید سلینیم (SiO_2) و EGCG از شرکت سیگما و کیت‌های اندازه‌گیری تری‌گلیسرید، کلسترول و HDL-کلسترول از شرکت زیست شیمی خریداری شدند.

روش

۲۰ موش صحرایی از نژاد Wistar انتخاب شدند و با رژیم غذایی پرچرب حاوی ۱ درصد کلسترول، ۱۰ درصد روغن ذرت و ۸۹ درصد غذای موش به مدت ۴ هفته تغذیه شدند. سپس از موش‌ها نمونه خونی تهیه و سطح سرمی تری‌گلیسرید، کلسترول و HDL-کلسترول آنها با استفاده از کیت اندازه‌گیری شد. ۱۵ موش زنده ماندند. آنها به ۳ گروه ۵ تایی تقسیم و هر سه گروه با همان رژیم غذایی پرچرب تغذیه شدند. گروه اول به عنوان کنترل انتخاب شد. به گروه دوم ۱ ml از EGCG با غلظت ۱mgr/ml و به گروه سوم ۱ ml از SiO_2 با غلظت ۱۰۰ ml تزریق شد. تزریقات به صورت داخل صفاقی، به مدت ۲ هفته و با فاصله زمانی ۴۸ ساعته انجام شد. پس از دو هفته مجدداً از موش‌ها نمونه خونی تهیه و سطح سرمی تری‌گلیسرید، کلسترول و HDL-کلسترول آنها اندازه‌گیری شد [۱]. داده‌های حاصل از اندازه‌گیری تری‌گلیسرید، کلسترول و HDL-کلسترول برای مشخص شدن تفاوت بین سه گروه، براساس آزمون کرووسکال-والیس آنالیز شدند. سپس داده‌های حاصل از اندازه‌گیری تری‌گلیسرید، کلسترول و HDL-کلسترول برای گروه‌های دوم و سوم براساس آزمون من-ویتنی آنالیز شدند تا مشخص شود که اثرات EGCG و یا SiO_2 در کاهش سطح سرمی تری‌گلیسرید، کلسترول و HDL-کلسترول چگونه است.

چای سبز (C. sinensis L.) از خشک کردن برگ‌های تازه چای حاصل می‌شود. چای سبز حاوی ترکیبات پلی‌فنولیک شامل اپی‌گالوکاتشین-۳-گالات (EGCG)، اپی‌گالوکاتشین (EC)، اپی‌کاتشین‌گالات (ECG) و اپی‌کاتشین (EC) است که با نام عمومی کاتشین معروف هستند (شکل شماره ۱).


یکی از فراوان‌ترین کاتشین‌های چای سبز EGCG است. بقیه کاتشین‌ها ۳-۱۰ درصد از کاتشین‌های این گیاه تشکیل می‌دهند. EGC و EGCG دارای بیشترین اثر آنتی‌اکسیدانی در بین کاتشین‌های چای سبز می‌باشند و سبب کاهش اکسیداسیون کلسترول و اسیدهای چرب لینولئیک و آرشیدونیک می‌شوند. همچنین این دو کاتشین به طور قابل توجهی سبب کاهش تولید رادیکال‌های آزاد هیدروکسیل و آنیون سوپراکسید می‌شوند [۳]. سلتیوم که کوفاکتور آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز است، دارای خواص آنتی‌اکسیدانی می‌باشد. گلوتاتیون پراکسیداز از پراکسیداسیون اسیدهای چرب جلوگیری می‌کند و همچنین سبب کاهش تولید رادیکال‌های آزاد هیدروکسیل و آنیون سوپراکسید می‌شود [۴]. علاوه بر خاصیت آنتی‌اکسیدانی، کاتشین‌های چای سبز دارای فعالیت کاهش‌دهنده کلسترول سرم نیز می‌باشند. کاهش کلسترول سرم توسط کاتشین‌های چای سبز می‌تواند به کاهش و درمان بیماری‌های قلبی-عروقی کمک کنند. در حیوانات تغذیه شده با رژیم‌های غذایی با کلسترول و چربی بالا، پلی‌فنول‌های چای سبز از افزایش لیپیدهای سرم و کبد جلوگیری می‌کنند. همچنین کلسترول تام سرم و شاخص آتروژنیک را کاهش می‌دهند و دفع کلسترول و لیپید تام را از طریق مدفوع افزایش می‌دهند. در هامسترها تغذیه شده با رژیم غذایی پرچربی، حیواناتی که چای سبز یا پلی‌فنول‌های چای سبز مصرف کرده‌اند، تری‌گلیسرید و کلسترول پایین‌تر و میزان دفع چربی بیشتری از طریق مدفوع، نسبت به گروه کنترل دارند [۱].

مواد و روش‌ها

حیوانات

از موش‌های نر نژاد Wistar با سن یکسان و وزن تقریبی ۲۱۰-۲۲۵ گرم که از انستیتو پاستور کرج خریداری شده





شکل شماره ۱- ساختار شیمیایی کاتشین‌های چای سبز

جدول شماره ۱ - مقایسه سطح سرمی تری‌گلیسرید، کلسترول و HDL-کلسترول در سه گروه موش‌ها

EGCG	SiO_2	کنترل	
$^{*} ۹۲/۴۰ \pm ۲۵/۰۲$	$۱۳۳/۵۹ \pm ۴۰/۴۲$	$۱۴۶/۴۴ \pm ۲۵/۰۲$	کلسترول (mg/dl)
$۶۵/۰۵ \pm ۷/۷۰$	$۶۱/۲۲ \pm ۱۵/۴۰$	$۵۵/۴۴ \pm ۶/۱۶$	کلسترول-HDL
$۴۰/۰۴ \pm ۸/۱۹$	$۴۱/۸۶ \pm ۸/۱۹$	$۴۲/۷۷ \pm ۴/۵۵$	تری‌گلیسرید (mg/dl)

مقادیر بر حسب انحراف معیار \pm میانگین (ضریب اطمینان) بیان شده‌اند.

* به طور قابل توجهی با کنترل تفاوت دارد ($p < 0.05$).

قوی تری در کاهش سطح سرمی تری‌گلیسرید، کلسترول و افزایش HDL-کلسترول نسبت به SiO_2 می‌باشد، ولی اثر قابل توجه ECGC در کاهش سطح سرمی کلسترول است (جدول شماره ۱).

بحث

در مطالعات اپیدمیولوژیکی یک رابطه معکوس قابل توجه بین نوشیدن چای و سطح پلاسمایی کلسترول وجود دارد. مطالعات در مدل‌های حیوانی نشان داده است که کاتشین‌ها باعث مهار جذب توده‌ای کلسترول می‌شوند. Muramatsu و همکاران نشان

نتایج

پس از اندازه‌گیری سطح سرمی تری‌گلیسرید، کلسترول و HDL-کلسترول و آنالیز این داده‌ها در سه گروه براساس آزمون کروسکال-والیس، مشخص شد که بین سطح سرمی تری‌گلیسرید، کلسترول و HDL-کلسترول این سه گروه تفاوت معنی دار وجود دارد ($p < 0.0001$). سپس براساس آزمون من-ویتنی مشخص شد که بین گروه دوم و سوم نیز تفاوت معنی دار وجود دارد ($p < 0.0092$). از مقایسه میانگین گروه دوم و سوم مشخص شد که ECGC دارای اثرات



و لیپید تام از طریق مدفعه، نسبت به گروه کنترل دیده می شود [۵,۷,۸]. مقایسه EGCG با SiO_2 در کاهش سطح سرمی تری گلیسرید، کلسترول و افزایش HDL-کلسترول نشان داد که EGCG در کاهش سطح سرمی چربی های مذکور، دارای اثرات قوی تری است. بیشترین اثر EGCG بر روی سطح سرمی کلسترول می باشد که به طور قابل توجهی باعث کاهش آن می گردد. اگرچه هنوز مطالعات انسانی دقیقی بر روی EGCG صورت نگرفته است، ولی به نظر می رسد که در کاهش سطح سرمی کلسترول و دیگر لیپیدها در افراد هیپرکلسترولمیک و یا هیپرلیپمیک مفید باشد.

دادند که ابچی کاتشین چای سبز باعث افزایش دفع کلسترول و لیپید تام در موش های تغذیه شده با رژیم غذایی با کلسترول بالا می شود [۵]. Yang و همکاران نشان دادند که چای سبز چینی حاوی مقادیر بالاتری از EGCG نسبت به دیگر چای ها می باشد که به طور موثرتری سبب کاهش سطح سرمی کلسترول در موش ها می شود. در مطالعه ای دیگر نشان داده شد که EGCG نمی تواند سنتز کلسترول را مهار کند، ولی باعث کاهش جذب روده ای کلسترول می شود [۶]. چندین مطالعه در مدل های حیوانی نشان داده است که کاتشین های چای سبز ممکن است بر روی جذب چربی نیز تاثیر داشته باشد. در موش های تغذیه شده با کاتشین های چای سبز، افزایش قابل توجهی در دفع کلسترول

منابع

- Raederstorff DG, Schlachter MF, Elste V and Weber P. Effect of EGCG on lipid absorption and plasma lipid levels in rats. *J. Nutr. Biochem.* 2003; 14: 326 - 32.
- Chung S, Landau Y and Landau M. Effect of tea consumption on nutrition and health. *J. Nutr.* 2000; 130: 2409 - 2412.
- Osada K, Takahashi M, Hoshina S, Nakamura M, Nakamura S and Sugano M. Tea catechins inhibit cholesterol oxidation accompanying oxidation of low density lipoprotein *in vitro*. *Comp. Biochem. Physiol. Toxicol. Pharmacol.* 2001; 128: 153-164.
- Chatterjea MN and Shinde R. *Text book of medical biochemistry*. Fifth ed. JP Press. New Dehli. 2002, pp: 334-5.
- Muramatsu K, Fukuyo M and Hara Y. Effect of green tea catechins on plasma cholesterol level in cholesterol-fed rats. *J. Nutr. Sci. Vitaminol.* 1986; 32: 213-224.
- Chisaka T, Matsuda H, Kubomura Y, Mochizuki M and Yamahara J. The effect of crude drugs on experimental hypercholesterolemia: mode of action of (-)-epigallocatechin gallate in tea leaves. *Chem. Pharm. Bull.* 1988; 36: 227 - 233.
- Chan PT, Fong WP, Cheung YL, Huang Y and Ho WK. Jasmine green tea epicatechins are hypolipidemic in hamsters fed a high fat diet. *J. Nutr.* 1999; 129: 1094 - 1101.
- Ikeda I, Imasato Y, Sasaki E and Nakayama M. tea catechins decrease micellar solubility and intestinal absorption of cholesterol in rats. *Biochem. Biophys. Acta.* 1992; 1127: 141-146.
- Maron DJ, Lu GP, Li YH, Chen H and Zhao J. Cholesterol-lowering effect of a theaflavin-enriched green tea extract: a randomized controlled trial. *Arch. Intern. Med.* 2003; 163: 1448 -1453.
- Miura Y, Chiba T, Tomita I, Koizumi H and Miura S. Tea catechins prevent the development of atherosclerosis in apoprotein E-deficient mice. *J. Nutr.* 2001; 131: 27 - 32.
- Riemersma RA, Rice-Evans CA, Tyrrell RM, Clifford MN and Lean ME. Tea flavonoids and cardiovascular health. *Q. J. M.* 2001; 94: 277-82.
- Miura Y, Chiba T, Miura S, Tomita I and Umegaki K. Green tea polyphenols (flavan 3-ols) prevent oxidative modification of low density lipoproteins: an *ex vivo* study in humans. *J. Nutr.* 2000; 11: 216-222.

- 13.** Saffari Y and Sadrzadeh SM. Green tea metabolite EGCG protects membranes against oxidative damage *in vitro*. *Life Sci.* 2004; 74: 1513-1518.
- 14.** Higdon JV and Frei B. Tea catechins and polyphenols: health effects, metabolism, and antioxidant functions. *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.* 2003; 43: 89-143.
- 15.** Frei B and Higdon JV. Antioxidant activity of tea polyphenols *in vivo*: evidence from animal studies. *J. Nutr.* 2003; 133: 3275 - 3284.

